

Τα φάρμακα μειώνουν την μετάδοση του AIDS

Συντάχθηκε απο τον/την basilis
Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 20:43



Όσο νωρίτερα ξεκινήσει κάνεις θεραπευτική αγωγή με αντικά φάρμακα, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

Η έγκαιρη φαρμακευτική αγωγή με αντικά σκευάσματα στους πάσχοντες από Aids μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού HIV στους υγιείς συντρόφους τους, προκύπτει από τα συμπεράσματα μίας πρώτης κλινικής έρευνας.

Τα ευρήματα συνηγορούν επίσης πως η προστασία είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν η λήψη των ειδικών φαρμάκων αρχίσει όσο το δυνατόν ταχύτερα, καταδεικνύοντας την αναλογία στη σχέση χρόνου διάγνωσης και προστασίας κι αποτελέσματος.

Η κλινική έρευνα, γνωστή ως HPTN 052, επρόκειτο να περατωθεί το 2015, ωστόσο τα ευρήματά της δημοσιεύθηκαν νωρίτερα διότι η φαρμακευτική αγωγή λειτούργησε σχεδόν στην εντέλεια.